

是 Mu8# 因素 Sv 的 BrNxrf 的 br 肤疾病" Bb EbN Eb x 及 C w 有效治疗, ; V~作 Sv"u 常 sr 肤 N O 肥 F# "K 有 7 定的 - 素 F 主要 B 现" 患者常有 * m 0 度的 痒 y"y 常, # f 习# 0 作等 2 成 R 5 6 \$1% V 方 x 菌素 Bx 是 前 美 h C K o R J 治疗 Mu q 菌 br 肤 y 疾病常用的药物 \$2% 9 { 具有强 k 的抗 # 抗 F T # R 痒效 3 " 0 u r 肤疾病的治疗 1 C 9 F 常用 \$3% d () 用 V 方 x 菌素 Bx O J 9 { K B b 进行治疗" 有效? : 治疗效 3 J A ; V ~ 1 " # 临床) < = C D b + " 4 5 如 6 & 1 资料与方法 1.1 7 8 9 : ; < 2016 年 1 = (2017 年 10 = 收

治的 156 ? B b 患者 " \$ u L w i B 法 E 成 G H I J K L I M 78 ? & G H I N 41 ? " O 37 ? ' 年龄 21 (69 43.29) 10.67 ! P ' 病 0 4 | = (6 年 " 平均 1.89) 0.97 年 ' r M + , Q 29 ? " n 18 ? " , Q J K n 15 ? " + M 6 ? " + M J K , Q 5 ? " + M J K n 3 ? " + M # , Q # n 均有者 2 ? ' r < + T 5 (30 16.34) 6.81 ! cm² & K L I N 40 ? " O 38 ? ' 年龄 23 (68 42.87) 10.73 ! P ' 病 0 3 | = (7 年 " 平均 1.93) 0.99 年 ' r M + , Q 30 ? " n 17 ? " , Q J K n 16 ? " + M 5 ? " + M J K , Q 4 ? " + M J K n 4 ? " + M # , Q # n 均有者 2 ? ' r < + T 4 (27 15.98) 6.93 ! cm² & S 有患者均 Q A

菌y者")~治疗1 8)用rm8 " B药物治疗者" J K心# #' #D功能#8 E o] 5#免疫] 5#Y "] 5功能LM者" J K F b v w者#K) * + 1 S用药物F T者" v w w及x { w 0及 J 3进行3 | = u访者" C d及患者K) ~ * + 均G晓m n " K E F G H m n I ") * + 获d > g理h i j l r & m = " \ I年龄# b ~等 P ^ ` a P > 0.05! " 具有\$] b &

1.2 方法 K L I)用 9 { l 美"药\!进行治疗+ < • k涂 U患v " K作"度\$摩"2 ~ /d"连s 4w & G H I 0 K L I o 上y z V方 x 菌素B x 5 6 @ ^药`有a d e !进行治疗+ < • k涂 U患v " "度\$摩"3 ~ /d"连s 4w" n 2与 9 { D隔20(30min & S用&

1.3 临床G H X q r \ I治疗效3 # * 良; 2 #3 | = 8 V ~ 1及 痒< = C D # r < = C D & 治疗效3 L f s % E ~ 0 治疗前# & K患者(u) J G)进行8 E "(u) s 痒F主" G

B 1 两组治疗效果及j 发率比较[n(%)]

	n	治u	^效	有效	效	<有效	V ~
G H I	78	31(39.74)	26(33.33)	18(23.08)			
K L I	78	27(34.61)	23(29.49)	15(19.38)	0.01	144.48	411A52+1 10.5 Tf0.988636 0 0 1 415.56 690.24 988636 0 0 1 366.96
1 ²							
P							

) d e红% #1 #1 等" M) @ A # " #1 # R E ~ s 0 #1 #2 #3 E r " s M { 8 E 之J F < T E " s 治疗前# & < T E ! 的] ?作F疗效X w " 疗效X w = 治疗前T E -治疗 & T E ! /治疗前T E 8 100% & 治u + 疗效X w F 90% (100% ' ^效+ 疗效X w F 60% (89% ' 有效+ 疗效X w F 20% (59% ' 效+ 疗效X w < 20% & < 有效= 治u + ^效+ 有效& 痒及r < = C D 均s患者(8 F r &

1.4 5 6 f v理 w A均 SPSS 13.0 x 3 v理" 6 k 9 : 用 $\bar{x} \pm s$ B y "用t z { " 6 w 9 :)用n %! B y "用1² z { " P < 0.05 y ` a 具有5 6 f n 7 &

2 结果

2.1 \ I治疗效3 及V ~ 1] 9 与K L I相] 9 " G H I治疗< 有效1 P ^ b : " V ~ 1 l P ^ b ; P < 0.05! & } B 1 &

2.2 \ I 痒及r < = C D] 9 与K L I相] 9 " G H I 痒及r < = C D C P ^ b + P < 0.05! & } B 2 &

抗菌药物"u F u断与q菌& Q o相连 - 的蛋W
m ,) w 9菌的效3' , n | 利 H因l \$有效! "
r v 2 4 9 q

: 究 j 方 0 1 2 3 联合 4 德 5 6 7 治疗慢性 8 9 的疗效及对患者血清 TGF- β_1 的影响

任 松 y # 1 心 e > / _ 9 大 f y d y e > 湖 y 432000!

摘要:目的 * + V 方 o = | 0 J ? _ V 治疗 B b 的疗效及 K 患者 Y Q Y Q @ A , D 因 -D_i(TGF-D_i)的
5 6 & 方法 ; < d > 收治的 B b 型 患者 82 ? " u l e f k l i j * + i m 4 l ? & k l i z s ? _ V 治
疗" * + i _ 用 V 方 o = | 治疗 &] 9 \ i 患者临床疗效"治疗前 & Y Q TGF-D_i#TNF-3 4 平 s 及 功能 X q & 结
果 * + i 临床疗效 P ^ : \ k l i " ` a 有 5 6 f n 7 (P-0.01)! 治疗 & * + i Y Q TGF-D_i#TNF-3 4 平均 : \ k
l i ` a 有 5 6 f n 7 (P-0.01)! \* + i ALT#GCT 及 AST 均 ^ \_ ; \ k l i ` a 有 5 6 f n 7 (P-0.01)& 结论 V 方
o = | 0 J ? _ V 治疗 B b 型 疗效 ^ _ "能 有效 > 患者 功能" m c k TGF-D_i#TNF-3 等 q 胞因
具有 7 定 k " 作用" ^ 临床 & : &

关键词: V 方 o = | ' ? _ V ' B b

中图分类号: R512.62

文献标识码: B

文章编号: 1011-8174 2018!17-2723.02

B b 型 (CHB)是临床常}的 B b 疾病"A
5 6 \$1% " d h 年 < 有 9500 % @ F CHB 患者" <
33 % 因 y CHB 引) # A N a , x
& 前 K \ CHB 主要) 用抗病 药物进行治疗"
S 1 ? _ V 是临床常用的抗病 药物"主要药理
L " F 0 L Q 8 i q 胞 • 酶 O | A & " @ A 成 g O |
? _ h Z X O | 物" u 断 HBV-DNA
5 V " D & 但 ? _ V N 7 S 用疗效]] 难 s
达 w o w & V 方 o = | 是 7 u V J " j " 现代药理 f
证 m \$2% S \$ u F k " _ Z 酶 J O 酶 A 2 的 b #

k " 补 Q 的 c] • 1 2 " A ; W 等 b 介 m
的 4 平 " 最终) w 抗 # 抗 = A s 及 > q 胞
的作用 &) * +) 用 V 方 o = | 0 J ? _
V 治疗 CHB " K < 9 好疗效 & 4 5 如 6 &

1 资料与方法

1.1 7 8 9 : ; < 2015 年 4 = (2016 年 7 = d
> 收治的 82 ? B b 型 患者 & o B q r \$3% + 1!
均 J B b 型 的临床诊断 q r ' 2! PCR 法 z
! HBV-DNA 连 s 2 ~ s 上 b ' 3! 均 (N _
K E F G H m n i & p W q r + 1! J K 精 b #