

DOI: 10.13463/j.cnki.cczyy.2015.04.060

病程 3 月~3 年 ,平均病程(6.4 ±4.5) 月。2 组患者年龄、病程、皮损分布比较 ,差异无统计学意义(! > 0.05) ,具有可比性。诊断标准: 1) 青春期开始发病 ,皮损对称分布 ,多见于面部、背部、上胸等部位; 2) 皮损为黑头粉刺、毛囊性丘疹、脓疱、囊肿、瘢痕结节 ,呈慢性过程 ,常伴有皮脂溢出。

1.2 治疗方法 治疗组患者给予复方多黏菌素 B 软膏(浙江日升昌药业) 涂于患处 ,并轻轻按摩 2 次/ d ,用药过程中避免药物接触眼、口等部位 ,同时口服裸花紫珠胶囊(江西杏林白马药业) 3 次/ d ,3 粒/ d ,疗程共 4 周。对照组患者仅给予复方多黏菌素 B 软膏治疗 ,用药方法同治疗组。

1.3 疗效标准 痊愈: 皮损全部消退 ,临床症状基本消失 ,治疗指数 ≥90% ; 显效: 皮损大部分消退 ,临床症状显著减轻 ,治疗指数 ≥60% ; 好转: 皮损部分消退 ,临床症状有所减轻 ,治疗指数 ≥20% ; 无效: 皮损消退不明显 ,临床症状减轻不显著 ,治疗指数 <20% 。

1.4 统计学方法 数据分析采用 SPSS 10.0 软件统计 ,